

Nabehandeling pancarpaal arthrodese hond

Bij uw hond is een operatie uitgevoerd waarbij de pols (“carpus”) over alle (“pan”) gewrichtsgeledingen is vastgezet (“arthrodese”).

Om op termijn alle gewrichtsgeledingen volledig benig vergroeid te doen zijn, is hiervoor in alle gewrichtsspletten het kraakbeen weggefrased en zijn er gaatjes in het bot aangebracht, waarin bot transplantaat, dat doorgaans uit de schouder wordt gehaald, is ingebracht.

Voor de fixatie is een botplaat met botschroeven aangebracht. In principe kan deze blijven zitten, echter soms kan het aangewezen zijn deze in de toekomst te verwijderen.

De arthrodese heeft tot doel de instabiliteit in de pols, en daarmee de pijnlijkheid, op te heffen. Omdat de pols na deze ingreep niet meer kan buigen, wordt wel vaak een zgn “mechanisme” restkreupelheid gezien, die berust op deze bewegingsbeperking en niet op pijnlijkheid.

Initiële genezing zal 6-8 wkn duren, volledige benige vergroeiing doorgaan 3 tot 4 maanden.

Derhalve zijn voor een goed herstel zijn de volgende rustperiodes van groot belang:

- Eerste 2 wkn na operatie: zo volledig mogelijke rust: voor de deur uitlaten, zo min mogelijk lopen.
- Van 2-6 wkn na operatie: er mag weer wat gelopen worden, echter uitsluitend aan de riem. Als algemene richtlijn geldt: 1 a 2 min per dag uitbreiden.
- Op 8 wkn na operatie is het raadzaam controle opnamen van de pols te nemen in 2 richtingen. Indien goede genezing zichtbaar is kunnen bewegingsbeperkingen worden opgeheven. De kosten van controle röntgenopnamen zitten niet bij de operatieprijs in; desgewenst kunnen deze opnamen ook bij de eigen dierenarts worden genomen en (kostenloos) ter beoordeling naar ons worden gemaild.
- Binnen 5-7 dagen na operatie verwachten we een vorm van steunname (aantippen/licht belasten). Neemt u contact op als dit achterwege blijft. De totale herstelperiode kan 3 tot 6 maanden bedragen.