

Uitleg en nabehandeling femur-kop-hals-resectie

Bij uw huisdier hebben wij een zgn kophals-resectie van het dijbeen (femur) uitgevoerd. Hierbij worden de kop en hals van het heupgewricht middels een zaagsnede los gemaakt van het dijbeen en verwijderd, waardoor er dus niet langer een heupgewricht aanwezig is.

De ontstane ruimte wordt in een aantal weken tot maanden opgevuld met littekenweefsel, dat naast stabiliteit ook een zekere mate van beweeglijkheid toelaat en zo als "gewricht" kan functioneren bij niet te zware dieren (<10 kg).

Deze ingreep wordt toegepast wanneer het plaatsen van een kunstgewricht om (financiële) redenen geen optie is.

Om tijdens de genezingsfase niet teveel verplaatsing van het dijbeen te krijgen, is de eerste weken zo volledig mogelijk rust aangewezen.

Hiervoor kan de eerste 2 wkn deels benchrust aangewezen zijn. Gedurende kortere perioden op een dag mag uw hond of kat er even uit en los lopen, mits springen en rennen voorkomen kunnen worden.

In sommige gevallen wordt de ingreep beiderzijds uitgevoerd in 1 operatie. Extra aandacht voor rust is dan aangewezen. Ook kleinere sprongen dienen dan in ieder geval de eerste 2 wkn voorkomen te worden.

Na 2 wkn doen we doorgaans een controle op de kliniek en bespreken dan de verdere nazorg.

Verder is het van belang dat uw huisdier niet aan de wond likt of bijt. Hiervoor kan een MPS (medical petshirt) of kraag behulpzaam zijn.

Mbt de medicatie volgt u de richtlijnen op de verpakkingen die u heeft meegekregen.