

## Hernia perinealis

### Operatietechniek:

De operatie is gecombineerd met het vastmaken van de dikke darm en de blaas. Beide testikels zijn gecastreerd.

### Prognose:

De resultaten van de operatieve behandeling zijn in het algemeen goed. Ongeveer 80% van de patiënten herstelt volledig. Een klein aantal houdt problemen. Deze kunnen variëren van een lichte vorm van persen tot ernstige afwijkingen zoals incontinentie voor ontlasting. Blijven persen na de operatie kan twee oorzaken hebben: het opnieuw scheuren van de gereconstrueerde bekkenbodempieren of een verlamming van de endeldarm. Het eerste wordt vooral gezien bij honden met zwakke bekkenbodempieren, het laatste bij patiënten die al zeer lang klachten hebben. Een uitgescheurde reconstructie kan soms nog worden gerepareerd met een andere operatietechniek. Een verlamming van de endeldarm berust op onherstelbare beschadiging door overrekking. Dit kan alleen symptomatisch worden behandeld (zachter maken van de ontlasting).

Incontinentie is een zeer ernstige complicatie die gelukkig uiterst zeldzaam is. De oorzaak is een beschadiging van de zenuwen van de sluitspier of van de sluitspier zelf. Bij een deskundig uitgevoerde operatie is de kans op deze complicatie minimaal.

### Nazorg perineale hernia

#### Voeding:

De voeding mag niet te hard zijn, eventueel kan u wat Iso-gel in de voeding mengen. Dosering van de Isogel: 2 theelepels 1-2 keer daags. Dit kan opgehoogd worden naar 5 theelepels.

Soms kan u dit nog combineren met een klein beetje olijfolie.

Het doel is dat de ontlasting wat pasteus is.

#### Wond:

Om te voorkomen dat de hond aan de wond komt, adviseren wij u om gedurende 14 dagen een kraag om te doen. Dit geldt met name als u Chablis niet in de gaten kunt houden.

Om eventuele wondzwellings tegen te gaan is het mogelijk om 2-3 x per dag de wond te koelen met een natte theedoek.

Indien de wond vies zou worden mag u dit schoonmaken met een washandje en zuiver water.

## Rust:

Gedurende 4 weken rust: uitlaten aan de lijn, niet laten rennen en spelen, niet op of van verhogingen laten springen (hokrust), niet traplopen.

De eerste 3 dagen dient de hond elke 4 uur uit gelaten te worden, ook gedurende de nacht. Hierna kan u de tussentijd verlengen met 2uur per dag.

## Medicatie:

-Een ontstekingsremmer gedurende 10 dagen

-Tramadol (3-5 mg/kg 3dd) gedurende 5 dagen.

-Antibioticum

-Metronidazole gedurende 5 dagen

-Amoxicillinclavulaanzuur gedurende 7 dagen