

Hernia/uitpuilende tussenwervelschijf

Bij uw hond is een operatie uitgevoerd aan de rug of hals, waarbij een deel van de tussenwervelschijf dat druk veroorzaakte in het wervelkanaal, is weggenomen. Vaak betreft het de kern van de tussenwervelschijf; er is dan sprake van een echte hernia. Ook betreft het regelmatig de bovenrand van de tussenwervelschijf die uitpuilt; we spreken dan ook wel van een “bulging disc”.

In beide gevallen is het gevolg dat er druk op zenuwen en/of ruggenmerg ontstaat, met pijnlijkheid of zelfs verzwakking of verlamming van ledematen. Deze druk is door de operatie opgeheven.

Afhankelijk van de lokalisatie van het proces en van de ernst van de klachten vóór operatie, kan er een rest-zwakte van ledematen aanwezig zijn na operatie. Doorgaans verbetert dit in enkele dagen. Wanneer voorafgaand aan operatie reeds duidelijke verlamningsverschijnselen aanwezig waren, kan herstel 2 tot 3 wkn in beslag nemen.

In gevallen waarin blaas verzwakking aanwezig is en de hond niet zelfstandig kan plassen, kunnen we ervoor kiezen een blaascateter te plaatsen. Deze dient dan tenminste 4 x dag geleid te worden mbv een spuit waarmee de urine kan worden aangezogen.

In alle gevallen worden medicijnen meegegeven: ontstekingsremmers/pijnstillers en antibiotica; ook als de pijnlijkheid mee lijkt te vallen is het nodig deze pijnstillers te geven: dit bevordert het herstel!

Voorts zijn voor een goed herstel zijn de volgende rustperiodes van groot belang:

- Eerste 2 wkn na operatie (tot eerste controle) zo volledig mogelijke rust houden. Indien de hond ambulant is mag deze kleine stukjes lopen. Geen “rondes” maken.
- Als de hond niet ambulant is kan middels ondersteunen van de achterhand de beweging wat gestimuleerd worden.
- Als de hond niet ambulant is kan u starten met fysiotherapie, namelijk de hond op vier poten in het gras zetten is goed om het gevoel “terug” te krijgen. U kan ook fietsbewegingen maken met de achterpootjes, zodat de spieren gestimuleerd worden, u dient dit 4-6 keer per dag te doen gedurende ongeveer 5-10 minuten. U kan dit combineren met masseren van de achterhand.
- Op geleide van het beeld dat de hond vertoont zal bij de eerste controle verder afgestemd worden hoe het bewegingspatroon er uit mag gaan zien.